

Agrobio Inporo Flowbrix Profi 100ml tekuté měďnaté hnojivo omezující výskyt houbových chorob u brambor, okurek, papriky, broskvoně, jádřovin, jahodníku

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	448604
Hmotnost	0,1000
Balení	12,0000
Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny.	
Disponibilita na hlavním sídle:	38,0 kč

Agrobio Inporo Flowbrix Profi 100ml tekuté mědnaté hnojivo omezující výskyt houbových chorob u brambor, okurek, papriky, broskvoně, jadrovin, jahodníku

» ZAHRADA » přípravy na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis	Parametry
Obsahuje: měď Cu (min. 380 g/l)	Sazba DPH 21,00
Jak účinkuje? <ul style="list-style-type: none">• je tekuté koncentrované mědnaté hnojivo• určeno pro použití v zahradnictví, zemědělství a lesnictví• měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později oborňován, takže se prodlužuje období aktivity fotosyntézy• při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnoje• nedostatek mědi se projevuje zvláště na letkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vstříknutí nebo na půdách s<ul style="list-style-type: none">• vyšším obsahem organické hmoty (po zasařkách postříkaných střípkem)• Flowbrix Profi aplikujte do půdy před setím nebo postříkáním na list před výskytem příslušné zeleniny, ovocných, okrasných dřevin, révy vinné, kadeřovosti broskvoň, aj.	
Pro jaké rostliny je registrován? <ul style="list-style-type: none">• zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně, cukrovka, cibule, póř, celer, fazol, mrkev, petržel, ředkvičky, salát, špenát, aj.)• jahody, drobné bobuloviny• ovocné stromy (jablň, hrůšeň, slivoň, broskvoň, meruňka, šlešně, višně)• olešák• okrasné dřeviny (borovice, buk, modřín, listnáče, topol)• louky a pastviny• pole (prosy, sáboviny, kukurice, mák, krmn, chmel, aj.)	
Jak jej použít? <ul style="list-style-type: none">• postříkání• většinou po celou dobu vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní (sle sklizně)• mědnaté přípravky jsou obecně doporučovány také jako podzimní postřik ovocných stromů (po opadu listů) Měďnaté hnojivo. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a příslušné informace o přípravku.	
Údaje o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
Bezpečnostní pokyny: P281 Používejte postřikovací osobní ochranné prostředky. P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Obsah nádoby likvidujte v souladu s místními předpisy. Doplňující informace (pode čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP) EUH403 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Před použitím si přečtěte příložený návod k použití. Red Block Měď pro ovocná, zeleninu a okrasné rostliny.	
Obsahuje: měď Cu (min. 380 g/l)	
Podlína, indikace dávkování Aplikace Mědicí Broskvoň, Odolnost - Postříkání při nalévání pupenů, nepozdněji na počátku rašení. Mědnat také během vegetace až do období cca 3 týdnů před sklizní. Pro odolnost broskvoň, aplikace před výskytem kadeřavosti: 30 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 1,2,3 aktuální aplikace Borovice, Odolnost - Postříkání od května do srpna. 30 - 25 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Brambor, Plíseň bramborová - Aplikace postříkáním během vegetace až do doby posledního postřiku proti plísni bramborové. 6 - 25 ml / 2 l / 100 m ² Postřik 6,7,8 Cibule, Odolnost - Také pro póř, celer, chřest. Aplikace během celé vegetace pro odolnost rostlin před výskytem plísně. 25 ml / 2 l / 100 m ² Postřik 6,7 Cukrovka, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do doby posledního postřiku proti cercosporicé řepy. 12,5 - 25 ml / 2 l vody / 100 m ² Postřik 6,7,8 Drobné ovocná, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 6-30 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6,7,8 Fazol, Odolnost - Postříkání při vývinu pravých listů až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m ² Postřik 4,5,6,7 Hrušeň, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 0,2 l / 0,14 % roztok. 10 - 14 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6,7,8 Jahoda, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 0,05 % - 0,07 % roztok. 5 - 7 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6,7,8 Jadrovin, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 6 - 30 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6,7,8 Jahoda, Odolnost - Postříkání po sklizni plísň. Opakovat 2x 10-14 ml / 25 ml / 3 l vody / 100 m ² Postřik 7,8,9 Louky, Odolnost - Postříkání po podzimní pastvě nebo seči až do začátku vegetace. 13 - 25 ml / 2 l vody / 100 m ² Postřik 9,10,11,12,14 aktuální aplikace Meruňka, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 17,5 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6 Mrkev, Odolnost - Také petržel, ředkvička, salát, špenát. Postříkání během celé vegetace až do období 3 týdnů před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Okrasné dřeviny, Odolnost - Borovice, buk, modřín, listnáče, topol. Postříkání od května do srpna. 30 - 25 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Okurka, Odolnost - Také pro papriku, rajčata. Pole i skleníky. Aplikace od fáze 3. listů do sklizně. Pro odolnost rostlin před výskytem plísně. 25 ml / 3 l / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Okurka, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 20 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4 Paprika, Odolnost - Pole i skleníky. Postříkání od fáze 3. listů do sklizně. 25 ml / 3 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Páskovník, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 6-30 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6,7,8 Rajčata, Odolnost - Pole i skleníky. Postříkání od fáze 3. listů do sklizně. 25 ml / 3 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Réva vinná, Odolnost - Postříkání od fáze rašení do fáze ukončení tvorby hroznů. Pro odolnost révy, aplikace před výskytem plísňové. 12,5 - 25 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Slivň, Odolnost - Při nalévání pupenů, nepozdněji na počátku rašení. Mědnat také během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. Pro odolnost rostlin, aplikace před výskytem suchovlivnosti. 20 - 40 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4 Třešň, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 20 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6 Třkvička, Odolnost - Jednou skupinu (okurky, cukety, melouny, aj.) Postříkání během celé vegetace pro odolnost, před výskytem plísně. 25 ml / 2 l vody / 100 m ² Postřik 5,6,7,8 Višeň, Odolnost - Postříkání během celé vegetace až do období cca. 3 týdnů před sklizní. 20 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m ² Postřik 3,4,5,6	