


# AgroBio Revus 50ml plíseň bramborová

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	426402
Hmotnost	0,0800
EAN	8594013426169
Balení	12,0000

Fungicid pro ošetření brambor proti plísni bramborové.

Dostupnost na hlavním skladě: 1,0 ks

# Agrobio Revus 50ml plíseň bramborová

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

## Popis

### Údaje o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Bezpečnostní údaje:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 1,2 benzisotiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Fungicidní přípravek proti plísni bramborové na bramborách.

**Účinná látka:** mandipropamid 250 g/l

### Jak účinkuje?

Přípravek REVUS obsahuje účinnou látku mandipropamid ze skupiny amidů karboxylových kyselin. Mandipropamid má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogenu do pletiva hostitele; kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukcí sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako *Phytophthora infestans* (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu, na kterou je schopen se rychle navázat a jakmile postřík uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Nejlepších výsledků při ochraně brambor je dosaženo, je-li přípravek REVUS aplikován protektivně nebo v raném stádiu vývoje choroby.

### Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

- brambory (plíseň bramborová)

### Jak jej použít?

- preventivně nebo při prvních příznacích choroby
- max. 6x za vegetaci
- interval mezi aplikacemi 7-10 dní
- postřík ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

### Balení:

- 10 ml je na 200 m<sup>2</sup> plochy
- 50 ml je na 1.000 m<sup>2</sup> plochy
- 250 ml je na 5.000 m<sup>2</sup> plochy

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

## Parametry

Sazba DPH

21,00