

Agrobio Touchdown Quattro 250ml

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům



Kód produktu	449392
Hmotnost	0,2600
EAN	8594013422321
Balení	6,0000
Dostupnost na hlavním skladě:	
6,0 ks	

Agrobio Touchdown Quattro 250ml

» ZAHRAĐA » přípravky na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

Popis Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace.	Parametry Sazba DPH	21,00
Účinná látka: glyfósát 360 g/l		
Jak účinkuje? TOUCHDOWN QUATTRO obsahuje účinnou látku glyfósát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systematický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. V rostlinách se rychle šíří. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je TOUCHDOWN QUATTRO translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Proto je důležité, aby plevelé dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku TOUCHDOWN QUATTRO do oddenků, je vždy třeba počkat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvěštiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje.		
Pro jaké rostliny je registrován? cesty mezi záhony nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, antukové hrsti, aj.) půda (příprava před výsevem, výsadbou) réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoni)		
Jak jej použít? postřikem na vzlehlé plevely (je přijímám zelenými částmi rostlin) přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! aplikujte pozorně postřikem nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)		
Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Kalkulačka Nezemědělská půda, Nežádoucí dřeviny - Nátěr nebo nástřík 15% roztoku do záseků kmínku. 150 ml / 1 l / 100 m2 Nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Orná půda, Plevely vytrvalé - Po sklizni. Orná půda, strniště. Ošetřuje se proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům po sklizni. 40 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 8,9,10 Orná půda, Pýr plazivý - Po sklizni. Orná půda, strniště. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3-4 vyvinutých listů. 30-40 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 8,9,10 Ovocné dřeviny, Plevely - OL=7. Mimo broskvoň, Mléč, pcháč, pýr plazivý, svisláček rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Ovocné dřeviny, Plevely jednoleté - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Ovocné dřeviny, Turanka kanadská - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Turanka kanadská - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevely - OL=7. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svisláček rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevely jednoleté - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svisláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p fi kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - Aplikace na hrsti, chodních, parkových, hřbitov, skladovacích plochách, v areálech podniků, apod. 40-50 ml / 1-2 l / 100 m2 Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Plevely jednoleté - Cesty mezi záhony, komposty. 20-30 ml / 1-3 l / 100 m2 Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Plevely vytrvalé - Cesty mezi záhony, komposty. 30-50 ml / 1-3 l / 100 m2 Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Půda, Plevely jednoleté - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 20-30 ml / 1-2 l / 100 m2 Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevely jednoleté - Příprava před výsadbou. Výsadbou po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 20-30 ml / 1-2 l / 100 m2 Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevely vytrvalé - Příprava před výsadbou. Výsadbou po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 30-40 ml / 1-2 l / 100 m2 Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevely vytrvalé - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 30-40 ml / 1-2 l / 100 m2 Postřik 3,4,9,10		