

# AgroBio Zdravá jahoda NEW - souprava přípravků Inporo Ligno Výnos a Serifel proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	448683
Hmotnost	0,1700
EAN	8595660506075
Balení	6,0000

Souprava dvou přípravků (INPORO Ligno Výnos a Serifel) pro bohatou úrodu, proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

Dostupnost na hlavním skladě: 12,0 ks

# Agrobio Zdravá jahoda NEW - souprava přípravků Inporo Ligno Výnos a Serifel proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

## Popis

Souprava dvou přípravků (INPORO Ligno Výnos a Serifel) pro bohatou úrodu, proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

### Účinné látky:

INPORO Ligno Výnos - Draselný komplex nitrofenolátů draselných a lignohumátu

Serifel - Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600; 5,5 x 1010 CFU/g

### Jak účinkuje?

Serifel - biologický fungicidní postřikový přípravek proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

Je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub. Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny mikrobiálních narušitelů. Bacillus amyloliquefaciens má silný fungicidní účinek.

### INPORO Ligno Výnos - rostlinný biostimulátor

Je určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce. Projevuje se lepším zakořeňováním a zlepšeným příjmem živin.

### Pro jaké rostliny a problémy?

jahodník  
plíseň šedá  
sklerotiniová hniloba  
podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda

### Jak ji použít?

- ošetření: Inporo Ligno Výnos a kvalita - pro dodání živin, silnější zakořeňování. Aplikujte brzy z jara, postřikem (neaplikovat na květ). Dávkování - 2,5ml/ 1l voda / 10 m2
- ošetření: Inporo Ligno Výnos a kvalita - dodání živin, pro zvýšení výnosu a kvality. Aplikujte postřikem před kvetením, 10 - 14 dní po první aplikaci. Dávkování - 2,5ml/ 1l voda / 10 m2
- ošetření: Serifel - proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě. Aplikujte preventivně, postřikem na celou listovou plochu. Před kvetením a kdykoli do druhé sklizně, interval mezi aplikacemi 5 dnů, max. 6x za rok. Dávkování - 1g/ 1l voda / 20 m2 aplikace postřikem

Nás tip: všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v záložce POUŽITÍ.

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

### Bezpečnostní pokyny:

- P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.  
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
EUH212 Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.  
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

## Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------