

Agrobio Zorvec entecta 10ml proti plísní brambor

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	449553
Hmotnost	0,1500
EAN	8595660505894
Balení	10,0000

Dostupnost na hlavním skladě:
Dostupné množství na prodejnách:

Na dotaz
15,0 ks
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 5
Obchod VLASTA
6,0 ks
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Květinka VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00
Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
9,0 ks
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Milevsko
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Agrobio Zorvec entecta 10ml proti plísni brambor

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e)

Kalkulačka

Brambor, Plíseň bramborová - OL=7. Postřikem od fáze 1. bazálního postranního výhonu, do konce zrání. Aplikujte preventivně. Max. 4x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dní. 2,5 ml / 5 l vody / 100 m² Postřik 5,6

Systémový fungicidní přípravek proti plísni bramborové na bramborách.

Účinná látka: amisulbrom 240 g/l, oxathiapiprolin 48 g/l

Jak účinkuje?

Zorvec ENTECTA je fungicid s ochranným účinkem proti plísni bramborové. Jedná se o kombinovaný fungicid, který tvoří translaminární oxathiapiprolin a translaminární amisulbrom. Účinná látka oxathiapiprolin patří do nové skupiny účinných látek. Působí jako modulátor proteinu vázajícího oxysterol v buňkách patogena. Proteiny vázající oxysterol se podílejí na pohybu lipidů mezi membránami. Inhibice těchto proteinů může narušit další procesy buňky patogena, jako je signalizace, udržování buněčných membrán a tvorba složitějších lipidů, které jsou nezbytné pro přežití buňky. Translaminární účinek vede k rovnoměrnější ochraně ošetřených listů a akropetální účinek pomáhá chránit listy a nové přírůstky, jež nejsou v době aplikace zcela vyvinuty. Účinná látka amisulbrom patří do skupiny účinných látek Qil fungicidů (Quinone inside inhibitors) (FRAC kód 21) s translaminárním a kontaktním působením. Působí v Qi místě cytochromálního komplexu a narušuje proces dýchání patogenů z rodu Oomycetes. Látka má preventivní i kurativní účinek (do 2 dní od začátku infekce). Inhibuje sporulaci, klíčení, pohyblivost zoospór a myceliární růst.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
brambory (plíseň bramborová)

Jak jej použít?

aplikuje se preventivně před objevením se prvních příznaků choroby
od fáze 1. bazálního postranního výhonu do konce zrání
max. 4x za vegetaci
interval mezi aplikacemi je 7 dnů
OL = 7 dnů
při aplikaci se snažte co nejlépe pokrýt listovou plochu
k zabránění vzniku rezistence aplikujte tento přípravek preventivně, a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------