Belanty 18ml Agrobio monilie, skvrnitosti, pa

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	426655
Hmotnost	0,2660
EAN	8595660504569
Balení	10,0000

Náhrada za Prolectus. Proti moniliové spále a hnilobě peckovin, proti padlí révy a dalším chorobám jabloní, hruškoní nebo brambor.

Dostupnost na hlavním skladě: <10
Dostupné množství na prodejnách: >10

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA
<10
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
>10
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
<10
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Belanty 18ml Agrobio monilie, skvrnitosti, pa

Popis

Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní a slivoní a proti padli révy a dalším chorobám jabloní, hrušní nebo brambor . Účinná látka: mefentriflukonazol 75 g/l Jak účinkuje? Účinná látka mefentriflukonazol patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI). Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? meruňka (moniliové spála a moniliová hnilioba) broskvoň (moniliové spála a moniliová hnilioba) višeň (moniliové spála a moniliová hnilioba) třešeň (moniliové spála a moniliová hnilioba) slivoň (moniliové spála a moniliová hnilioba) jabloň (strupovitost a padlí) hrušeň (strupovitost, padlí a stemfyliová skvrnitost hrušně) réva vinná (padlí a černá hnilioba révy) brambor (alternáriová skvrnitost) Jak jej použít? postřikem proti moniliové spále peckovin - obecně se postřik aplikuje 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání proti moniliové hnilobě peckovin - v době zralosti plodů (preventivně = před vznikem choroby), nutné dodržet OL = 3 dny brambory - od fáze 1. bazálního postranního výhonu (max. 5 cm) do fáze, kdy je většina naťě zbarvena žlutě réva - od fáze 4 pravých listů, listové páry / přesleny rozvinuty do fáze vybarvení bobulí. Při aplikaci přípravku v révě nelze vyloučit ovlivnění kvasných procesů. jabloň, hrušeň - od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do fáze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Před ošetřením jádrovin vyzkoušejte citlivost na menším počtu rostlin. postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně, a ne stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Brambor, Alternáriová skvrnitost - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřikem od 1. bazálního postranního výhonu (max. 5 cm) do fáze, kdy je většina naťě zbarvena žlutě. Aplikujte max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 12,5 ml / 4 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Hrušeň, Padlí - OL=28. Aplikujte preventivně, od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do váze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Dávku 2,34 ml / 1 l vody aplikujte jen 1x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7 Hrušeň, Stemfyliová skvrnitost - OL=28. Aplikujte preventivně, od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do váze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Dávku 2,34 ml / 1 l vody aplikujte jen 1x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7 Hrušeň, Strupovitost - OL=28. Aplikujte preventivně, od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do váze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Dávku 2,34 ml / 1 l vody aplikujte jen 1x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7 Jabloň, Padlí - OL=28. Aplikujte preventivně, od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do váze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Dávku 2,34 ml / 1 l vody aplikujte jen 1x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7 Jabloň, Strupovitost - OL=28. Aplikujte preventivně, od rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý do váze pokročilého zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Dávku 2,34 ml / 1 l vody aplikujte jen 1x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7 Meruňka, Moniliová hnilioba - OL=3. Aplikujte preventivně, do konzumní zralosti. Plody mají typickou chuť a optimální pevnost. Možné opakování po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 6,7,8 Meruňka, Moniliová spála - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřik je možný od fáze uzavřených květů s krátkými květními stopkami, kdy jsou mírně otevřené zelené šupiny. Obecně se provádí ošetření postřikem 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání. Opakování je možné po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 4,5 Paprika, Plíseň šedá - OL=1. Sklenílky. Aplikujte preventivně, od 61 BBCH (počátek kvetení). Aplikujte max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 12 g / 5-10 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Rajčata, Plíseň šedá - OL=1. Sklenílky. Aplikujte preventivně, od 61 BBCH (počátek kvetení). Aplikujte max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 12 g / 5-10 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Réva vinná, Černá hnilioba - OL=21. Aplikujte preventivně, od fáze 4 pravých listů, listové páry / přesleny rozvinuty do fáze vybarvení bobulí. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7,8 Réva vinná, Padlí révové - OL=21. Aplikujte preventivně, od fáze 4 pravých listů, listové páry / přesleny rozvinuty do fáze vybarvení bobulí. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 2 ml / 1 l vody Postřik 4,5,6,7,8 Broskvoň, Moniliová hnilioba - OL=3. Aplikujte preventivně, do konzumní zralosti. Plody mají typickou chuť a optimální pevnost. Možné opakování po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 6,7,8 Broskvoň, Moniliová spála - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřik je možný od fáze uzavřených květů s krátkými květními stopkami, kdy jsou mírně otevřené zelené šupiny. Obecně se provádí ošetření postřikem 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání. Opakování je možné po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 4,5 Slivoň, Moniliová hnilioba - OL=3. Aplikujte preventivně, do konzumní zralosti. Plody mají typickou chuť a optimální pevnost. Možné opakování po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 6,7,8 Slivoň, Moniliová spála - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřik je možný od fáze uzavřených květů s krátkými květními stopkami, kdy jsou mírně otevřené zelené šupiny. Obecně se provádí ošetření postřikem 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání. Opakování je možné po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 4,5 Višeň, Moniliová hnilioba - OL=3. Aplikujte preventivně, do konzumní zralosti. Plody mají typickou chuť a optimální pevnost. Možné opakování po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 6,7,8 Višeň, Moniliová spála - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřik je možný od fáze uzavřených květů s krátkými květními stopkami, kdy jsou mírně otevřené zelené šupiny. Obecně se provádí ošetření postřikem 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání. Opakování je možné po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 4,5 Třešeň, Moniliová hnilioba - OL=3. Aplikujte preventivně, do konzumní zralosti. Plody mají typickou chuť a optimální pevnost. Možné opakování po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 6,7,8 Třešeň, Moniliová spála - OL=3. Aplikujte preventivně. Postřik je možný od fáze uzavřených květů s krátkými květními stopkami, kdy jsou mírně otevřené zelené šupiny. Obecně se provádí ošetření postřikem 1x na začátku kvetení a 1x při dokvétání. Opakování je možné po 7 dnech. Max. 2x za vegetaci. 1,8 ml / 1 l vody Postřik 4,5 Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Bezpečnostní údaje: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv. P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Parametry

Výrobce	Agrobio