

Bellis 3x8ml Agrobio padlí, strupovitost

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	426656
Hmotnost	0,0300
EAN	8594013428651
Balení	8,0000

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jaderovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Bellis 3x8ml Agrobio padlí, strupovitost

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jaderovin, padlí jabloňového a strupovitosti. Účinná látka: boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg Jak účinkuje? Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? Jaderoviny (padlí, strupovitost, skládkové choroby) Jak jej použít? padlí jabloňové, strupovitost - aplikace při nebezpečné infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH54 - 85: BBCH54 - fáze myšího ouška BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení skládkové choroby - aplikace před sklizní v BBCH77 - 85: BBCH77 - plod dosahuje asi 70% konečné velikosti BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení maximální počet aplikací 4x postřik opakujte po 8-14 dnech postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Náš tip: všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Jaderoviny, Padlí - OL=7. Ve fázi myšího ouška až do doby pokročilého zrání. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 8-14 dní 8 g / 10 l vody Postřik 4,5,6,7 Jaderoviny, Skládkové choroby - OL=7. Aplikace před sklizní (plod dosahuje 70% velikosti až do doby pokročilého zrání. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 8-14 dní 8 g / 10 l vody Postřik 7,8,9 Jaderoviny, Strupovitost - OL=7. Ve fázi myšího ouška až do doby pokročilého zrání. Max. 4x za vegetaci. Interval opakování 8-14 dní 8 g / 10 l vody Postřik 4,5,6,7 Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv. P391 Uniklý produkt seberte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Parametry

Výrobce	Agrobio
---------	---------