

Dagonis 6ml Agrobio padlí, strupovitost, čerň

» ZAHRAIDA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	424467
Hmotnost	0,1450
EAN	8595660503210
Balení	10,0000

Fungicidní přípravek k ochraně ovoce a zeleniny proti houbovým chorobám, včetně hlízenky obecné (sclerotinia = půdní choroba).

Dostupnost na hlavním skladě: <10
Dostupné množství na prodejních: >10

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

<10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -

IHNED

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -

do 1 dne

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

>10

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Dagonis 6ml Agrobio padlí, strupovitost, čerň

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Bezpečnostní údaje: P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P280 Použijte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P391 Uniklý produkt seberte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sbětný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH208: Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON Fungicidní přípravek k ochraně ovoce a zeleniny proti houbovým chorobám. Účinná látka: fluxapyroxad 75 g/l (6,98 % hmot), difenokonazol 50 g/l (4,66% hmot.) Jak účinkuje? Přípravek Dagonis kombinuje vlastnosti obou účinných látek. Fluxapyroxad má preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci, tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby. Difenokonazol je systemická fungicidní látka ze skupinů triazolů, která působí preventivně a kurativně na široké spektrum chorob přenášených listy, osivem a půdou, jejichž původcem jsou askomycety, basidiomycety a deuteromycety. Látka poskytuje dlouhodobou ochranu proti chorobám obilnin, ovoce a zeleniny, včetně padlí, rzi, strupovitosti a skvrnitosti listů. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? jádroviny (strupovitost, padlí jabloňové) rajče, paprika, baklažán (padlí, hnědá skvrnitost) tykvovitá zelenina (padlí, černá hniloba) mrkev (padlí, suchá skvrnitost listů, černá hniloba, hlízenka obecná = sclerotinia) petržel kořenová (padlí, alternáriová skvrnitost, hlízenka obecná = sclerotinia) salát (hlízenka obecná = sclerotinia) květák, brokolice, zelí, kapusta hlávková (alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých) jahodník (padlí) Jak jej použít? jádroviny - postřikem od počátku rašení až do počátku zrání, max. 3x za rok, interval mezi postřiky 7 dnů zelenina (dle uvedených plodin) - postřikem od fáze 3-5. pravého listu (dle plodiny) do sklizně, max. 2-3x za rok) dle plodny, interval mezi postřiky 7 dnů jahodník - postřikem od začátku kvetení do druhé sklizně, max. 3x za rok, interval mezi postřiky 7 dnů postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Parametry

Výrobce	Agrobio
---------	---------