

Hořká sůl s boraxem 1kg Forestina

» ZAHRADA » hnojiva tekutá, sypká, krystalická



Kód produktu	23590256
Hmotnost	1,0200
EAN	8595618401766
Balení	12,0000
Množství na paletě	720,0000

Hořká sůl s BORAXEM se používá jako hnojivo určené k odstranění nedostatečné výživy plodin a stromů bórem a hořčíkem.

Dostupnost na hlavním skladě: 6,0 ks
Dostupné množství na prodejních: 10,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 4

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně

- **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské

potřeby

6,0 ks

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

4,0 ks

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Hořká sůl s boraxem 1kg Forestina

» ZAHRADA » hnojiva tekutá, sypká, krystalická

Popis

Hořká sůl s BORAXEM se používá jako hnojivo určené k odstranění nedostatečné výživy plodin a stromů bórem a hořčíkem. Bór ovlivňuje významně klíčivost pylu a je důležitý prvek výživy, ovlivňuje vývin letorostů a odolnost rostlin vůči houbovým chorobám. Nedostatek bóru způsobuje srdéčkovou hnilobu u řepy, cukrovky, poškození bulev celeru. Jeho nedostatek se projevuje zejména u hrušek kaménčitostí, u jablek horkou pihovatostí plodu, obecně poškozením a snížením úrody plodu. Nedostatek bóru dále poškozuje vývin letorostů stromů a snižuje odolnost proti houbovým chorobám. Při nedostatku hořčíku nedosahují rostliny dobrých výnosu ani výborné jakosti, listová zeleň není dostatečně sytá, listy mezi nervaturou žloutnou a později až hnědnou a rostliny chřadnou.

Složení:

15% MgO + 11% S

Použití:

Horká sůl s Boraxem se aplikuje rozhozením a zapravením do půdy brzy na jaře nebo na podzim (pro příjem kořeny musí mít půda teplotu nad bodem mrazu) nebo pak během vegetace 3-5 postřiky 2,5% roztokem na list (při rašení pupenů, před a po květu, koncem června) v průběhu vegetace dle zjištěné potřeby.

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------