Inporo Anticell Micomix 2x10g Agrobio biostimulant z mykorhizních hub, bakterií a chelátových mikroživin

» ZAHRADA » VÝSEV potřeby pro výsev » stimulátory růstu



Kód produktu	448836
Hmotnost	0.0350
EAN	8595660502757
Balení	12.0000

Dostupnost: na hlavním skladě
Dostupné množství na prodejnách.

+10
+10
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nakoupte prostřednictvím: E
Obchod VLASTA
448836
Dostupnost pro E-SHOP - **448836** Dostupnost pro vložení vyznačených na prodejně - **448836**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
OBCHOD VLASTA - Tábor
Nakoupit
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro vložení vyznačených na prodejně - **do 1 dne**
Obchod VLASTA - Tábor
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
Kvalita VLASTA
Nakoupit
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro vložení vyznačených na prodejně - **do 1 dne**
• Hradiště náměstí 629, Tábor
• +420 736 489 903
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00
Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nakoupit
• Hradiště 629, Tábor
• +420 736 489 903
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nakoupit
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro vložení vyznačených na prodejně - **do 1 dne**
• Mánesova 939, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Milevsko
Nakoupit
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro vložení vyznačených na prodejně - **448836**
• Milevsko
• +420 775 987 637
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Inporo Anticell Micomix 2x10g Agrobio biostimulant z mykorhizních hub, bakterií a chelátových mikroživin

Popis

Rostlinný biostimulant z mykorhizních hub, rhizosférních (kořenových) bakterií a chelátových minerálů (Fe, Mn, Zn, Cu) + B, Mo. Probiotika + živiny. Obsahuje mykorhizní houby Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae, Funneliformis caledonium rhizosférní bakterie minerálními živiny (železo (Fe), mangan (Mn), bór (B), zinek (Zn), měď (Cu), molybden (Mo) jak účinkuje? Použití ATLANTICELL MICOMIX v sadbu přináší extra rychlou kolonizaci kořenů rostlin prostřednictvím mykorhizních mikroorganismů, které pomáhají zpřístupňovat některé živiny, jako jsou K, P a Si. obsažené mykorhizní houby zlepšují absorpci vody a minerálních živin z půdy a zvyšují tak odolnost rostlin vůči suchu. Přítomnost chelátovaných mikroprvků podporuj vývoj rostlin a zvyšují produktivitu rostlin => zvyšuje velikost plodů zlepšuje vývoj kořenů a podporuje zdravé kořeny (vysokou aktivitou obrané kořenový systém, na který se pak nedostanou jiné, např. nežádoucí houby nebo bakterie) velmi účinný pro mladé rostliny (proti fáze růstu), účinný právě v do 48 hodin velký přírůstek kořenového vláskání Pro jaké rostliny je registrován? vhodný pro všechny běžné pěstované v zahrádkách (zelenina, bylinky, jahodníky, okrasné rostliny a dřeviny) ovocné dřeviny, citrusy vhodný i pro sysatomické rostliny, tj. borůvky, mnohaletkony, azalky, aj. jak je použít? plodiny pěstované v zahrádkách, tj. zelenina, jahodníky, okrasné rostliny a dřeviny. Aplikujte zálivkou 1-2x po přesazení nebo na začátku vegetace v dávce 10-20 g / 1-2 l vody / 100 m2 (max. 1% roztok). Malé potřeby můžete využít dávku vody. Dávkění je zachovat dávku přípravku na m2. ovocné stromy (jeřabiny, jabloně a citrusy). Aplikujte zálivkou 2x po přesazení nebo na začátku vegetace v dávce 1,5 g / na rostlina. Aplikace: Rozpouštění/ředění/aplikace/dávkování/aplikace/aplikace: Rozpouštění/ředění/aplikace/dávkování/aplikace/aplikace hrách, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Fík, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Fík, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Brambor, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brambor, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brukvovitá zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brukvovitá zelenina, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Celer, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Celer, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cibule, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cibule, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cibulky, Odstínost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od nálevi. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Celeria, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Celeria, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cesnek, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cesnek, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Fazol, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Fazol, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Hrách, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Jádrovny, Odstínost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od nálevi. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Kedluby, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kedluby, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kořenová zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kořenová zelenina, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Mrkev, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Mrkev, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Okurka, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Okurka, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Paprika, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Paprika, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Pecňovky, Odstínost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od nálevi. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Petržel, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Petržel, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Pistácií zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Pistácií zelenina, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Rajčata, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Rajčata, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Ředkvička, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Ředkvička, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Řepa, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Řepa, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Salát, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Salát, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu/při nebo vzejití na zálivkě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Špenát, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Špenát, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykev, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykev, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykvovitá zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykvovitá zelenina, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě nebo po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě nebo po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelenina, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě nebo po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zeď, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě nebo po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zeď, Odstínost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na zálivkě nebo po výsevu. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g/přípravku na 1 l vody).

Parametry

Výrobce	Agrobio