

Inporo Flowbrix Profi 100ml Agrobio tekuté mědnaté hnojivo omezující výskyt houbových chorob u brambor, okurek, papriky, broskvoně, jádřovin, jahodníku

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	448694
Hmotnost	0,1500
EAN	859560505641
Balení	12,0000

Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny.

Dostupnost na hlavním skladě:
Dostupné množství na prodejních:

27,0 ks
27,0 ks
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 6
Obchod VLASTA
27,0 ks
Dostupnost pro E-SHOP - **IMNEO** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejní - **IMNEO**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Tábor
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejní - **do 1 dne**
• Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
Květinika VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejní - **IMNEO**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00
Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nedostupné
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 993
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejní - **IMNEO**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Mlévsko
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejní - **IMNEO**
• Masarykova 281, Mlévsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Inporo Flowbrix Profi 100ml Agrobio tekuté měďnaté hnojivo omezující výskyt houbových chorob u brambor, okurek, papriky, broskvoně, jaderovin, jahodníku

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Obsahuje: měď Cu (min. 380 g/l) Jak účinkuje? Je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo určené pro použití v zahradnictví, zemědělství a lesnictví měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se prodlužuje období aktivní fotosyntézy při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv, nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaořávkách posklizňových zbytků) Flowbrix Profi aplikujte do půdy před setím nebo postřikem na list před výskytem plísní zeleniny, ovocných, okrasných dřevin, révy vinné, kadeřavosti broskvoní, aj. Pro jaké rostliny je doporučováno? Zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně, cukrovka, cibule, pór, celer, fazol, mrkev, petržel, fíkovníčky, salát, špenát, aj.) jahody, drobné bobuloviny ovocné stromy (jablňo, hrůšeň, slivoň, broskvoň, meruňka, třešeň, višně) ořešák okrasné dřeviny (borovice, buk, modřín, listnáče, topol) louky a pastviny pěstí plodiny (boboviny, kukuřice, mák, kmin, chmel, aj.) Jak jej použít? Postřikem většinou po celou dobu vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní (dle plodin) měďnaté přípravky jsou obecně doporučovány také jako podzimní postřik ovocných stromů (po opadu listů) Minerální hnojivo. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Údaje o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P281 Používejte ochranné osobní ochranné prostředky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Doplnující informace (podle čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP) EUH401. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Před použitím si přečtěte příložený návod k použití. Red Block Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny. Obsahuje: měď Cu (min. 380 g/l) Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Broskvoň, Odolnost - Postřikem při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Možnost také během vegetace až do období cca 3 týdny před sklizní. Pro odolnost broskvoní, aplikace před výskytem kadeřavosti. 30 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 1,2,3 aktuální aplikace Borovice, Odolnost - Postřikem od května do srpna. 30 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Brambor, Plíseň bramborová - Aplikace postřikem během vegetace až do doby posledního postřiku proti plísní bramborové. 6 - 25 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 6,7,8 Cibule, Odolnost - Také pro pór, celer, chřest. Aplikace během celé vegetace pro odolnost rostlin před výskytem plísně. 25 ml / 2 l / 100 m2 Postřik 6,7 Cukrovka, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do doby posledního postřiku proti cercosporické šepý. 12,5 - 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 6,7,8 Drobné ovoce, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 6 -30 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8 Fazol, Odolnost - Postřikem při výšvu pravných listů až do období cca. 3 týdny před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 4,5,6,7 Hrušeň, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 0,1 % - 0,14 % roztok. 10 -14 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8 Jablňo, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 0,05 % - 0,07 % roztok. 5 -7 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8 Jaderoviny, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 6 -30 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8 Rajčata, Odolnost - Pěle i skleníku. Aplikace od fáze 3. listu do sklizně. Pro odolnost rostlin před výskytem plísně. 25 ml / 3 l / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Ořešák, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 9,10,11,2,4 aktuální aplikace Meruňka, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 17,5 -35 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6 Mrkev, Odolnost - Také petržel, fíkovníčka, salát, špenát. Postřikem během celé vegetace až do období 3 týdny před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Okrasné dřeviny, Odolnost - Borovice, buk, modřín, listnáče, topol. Postřikem od května do srpna. 30 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Okurka, Odolnost - Také pro papriku, rajčata. Pěle i skleníku. Aplikace od fáze 3. listu do sklizně. Pro odolnost rostlin před výskytem plísně. 25 ml / 3 l / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Ořešák, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 9,10,11,2,4 aktuální aplikace Meruňka, Odolnost - Postřikem od fáze rašení do fáze ukončení tvorby hroznů. Pro odolnost révy, aplikace před výskytem plísní révové. 12,5 - 25 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Slivoň, Odolnost - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Možnost také během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. Pro odolnost rostlin, aplikujte před výskytem puchrovitosti. 20 - 40 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4 Třešeň, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 20 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6 Tykvičovitá zelenina, Odolnost - S jednou slupkou (okurky, cukety, melouny, aj.). Postřikem během celé vegetace pro odolnost, před výskytem plísně. 25 ml / 2 l vody / 100 m2 Postřik 5,6,7,8 Višně, Odolnost - Postřikem během celé vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní. 20 - 35 ml / 3-10 l vody / 100 m2 Postřik 3,4,5,6

Parametry

Sazba DPH

21,00