

Sanium Ultra 30ml SBM proti škůdcům na ovoci, zelenině a okr. rostlinách

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	424143
Hmotnost	0,0700
EAN	3664715010098

K ochraně okrasných rostlin, ovoce a zeleniny proti savým a žravým škůdcům.

Dostupnost na hlavním skladě: 67,0 ks
Dostupné množství na prodejnách: 31,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 4

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahradkářské potřeby

8,0 ks

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

23,0 ks

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Sanium Ultra 30ml SBM proti škůdcům na ovoci, zelenině a okr. rostlinách

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu

Popis

NÁHRADA ZA DECIS

Účinná látka: Deltamethrin 15g/l (1,5 % hmot.)

Popis:

Insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců jako jsou mandelinky, mšice, vrtule, květopas, obaleč, dřepčík a další savý a žravý hmyz. Je vhodný k použití předjarního postřiku na přezimující škůdce. Ochrání brambory, ovocné dřeviny, révu vinnou, luskoviny, brukvovitou zeleninu či jahodník. Účinkuje rychle, a to i při nižších teplotách. A také hubí savé a žravé škůdce na okrasných rostlinách, ochrání buxusy před zavíječem zimozrázovým. Při aplikaci dbejte na rovnoměrné pokrytí listů i ostatních zelených částí.

Způsob působení:

Deltamethrin, účinná látka přípravku Sanium Ultra, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svlušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin.

Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24 °C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.

Rozsah a použití postřiku Sanium Ultra:

- brambor, rajče mandelinka bramborová 3-3,5 ml; 4 l vody /100 m² podle signalizace ošetřovat v době max. líhnutí larev, do L3 (OL: 14 dní)
- ředkvička pilatka řepková, krytonosci rodu Ceutorrhynchus, blýskáček řepkový, housenky, dřepčící 3-5 ml ; 4 l vody /100 m²
- hrách mšice, třásněnky 3-3,5 ml ; 4 l vody /100 m² (OL: 7 dní)
- jablň obaleč jablečný 0,06-0,07 % ; 6-7 ml/10 l vody (OL: 28 dní)
- jahodník květopas jahodníkový 5 ml ; 6 l vody /100 m² před květem
- jádroviny, slivoň, třešeň, višněň saví škůdci, žraví škůdci 0,03-0,035 % ; (3-3,5 ml/10 l vody) od začátku výskytu (OL: 28 dní)
- cibule, pór vrtalka pórová 5 ml ; 4 l vody /100 m² OL 3 okrasné rostliny saví škůdci, žraví škůdci 0,03-0,05 % ; 3-5 ml/10 l vody (OL: 10 dní)
- réva obaleč 0,06-0,075 % ; 6-7,5 ml/10 l vody (OL: 21 dní)
- zelenina brukvovitá pilatka řepková, krytonosci rodu Ceutorrhynchus, blýskáček řepkový, housenky, dřepčící 3-5 ml ; 4 l vody /100 m² (OL: 7 dní)
- třešeň, višněň vrtule třešňová 0,06-0,08 (OL: 28 dní)

Dávkování:

Na 36-90 l aplikační kapaliny, tedy až na 600 - 900 m².

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------