Scala 10ml Agrobio plíseň šedá, strupovitost

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	423551
Hmotnost	0,0150
EAN	8595660502305
Balení	10,0000

Fungicidní přípravek k ochraně jádrovin proti strupovitosti, jahodníků a révy vinné proti plísni šedé. SCALA je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé, než mají klasické fungicidy.

Dostupnost na hlavním skladě: <10

Dostupné množství na prodejnách: >10

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA
<10
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
<10
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
<10
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Scala 10ml Agrobio plíseň šedá, strupovitost

Popis

Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5°C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají. Přípravek se aplikuje postřikem na jádroviny v době "do konce kvetení", max. 3x v intervalech 7-10 dnů (7.5ml/8lvody/40m2). U jahodníku na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení (10ml/8lvody/40m2). Postřik u révy vinné použijte - do BBCH 75 - bobule velikosti hrachu, hrozny svěšeny (10ml/5l vody). Ošetření ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). -lj-

Parametry

Výrobce	Agrobio