

Scala 10ml Agrobio plíseň šedá, strupovitost

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	423551
Hmotnost	0,0150
EAN	8595660502305
Balení	10,0000

Fungicidní přípravek k ochraně jaderovin proti strupovitosti, jahodníků a révy vinné proti plísní šedé. SCALA je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanismem účinku proti strupovitosti jaderovin a plísní šedé, než mají klasické fungicidy.

Dostupnost na hlavním skladě: 20,0 ks

Dostupné množství na prodejnách: 29,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

20,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- U Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

- Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Husovo náměstí 629, Tábor
 - +420 736 469 933
- obchod@obchodvlasta.cz

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 608 999 951
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 720 181 415
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

9,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Masarykova 281, Milevsko
 - +420 775 887 537
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Scala 10ml Agrobio plíseň šedá, strupovitost

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanismem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5°C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají. Přípravek se aplikuje postřikem na jádroviny v době "do konce kvetení", max. 3x v intervalech 7-10 dnů (7.5ml/8lvody/40m²). U jahodníku na počátku květu nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení (10ml/8lvody/40m²). Postřik u révy vinné použijte - do BBCH 75 - bobule velikosti hrachu, hrozny svěšený (10ml/5l vody). Ošetření ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). -lj-

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------