

Sulka Ca 200ml Biom

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	446291
Hmotnost	0,3100
EAN	8595078501273
Balení	12,0000
Množství na paletě	0,0000

Sulka Ca je víceúčelové kapalné hnojivo. Sulka Ca je kapalný sírný koncentrát s vysokým obsahem vápníku.

Dostupnost na hlavním skladě: 21,0 ks

Sulka Ca 200ml Biom

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Používá se jako půdní hnojivo zejména pro půdy chudé na síru, nebo jako aplikace pro rostliny náročné na síru. Sulka Ca je určena především pro základní hnojení půdy. Dále se tento koncentrovaný postřikový přípravek používá k ochraně rostlin proti houbovým chorobám (hl. padlí), postřik proti plísním a živočišným škůdcům, moření česneku a cibulovin. Postřikový přípravek ve formě s vodou mísitelného koncentrátu lze použít k ochraně rostlin proti kadeřavosti broskvoně, hálčivci a vlnovníku révoému. Postřik lze také použít proti přezimujícím škůdcům.

Rozsah a způsob použití:

Sulka Ca je určena především pro základní hnojení půdy. Aplikuje se po zředění vodou, v závislosti na náročnosti ošetřovaných rostlin na přihnojování sírou a vápníkem, v dávce 0,5 - 1,5 l přípravku na 100 m² v době vegetačního klidu. V případě olejnin je doporučená dávka 0,8 - 1,3 l tohoto hnojiva na 100 m², na přihnojení brambor dávka 0,5 až 0,6 na 100 m², brukvovitě a cibuloviny je vhodné přihnojovat dávkou 1 a 1,2 l hnojiva na 100 m². Při hnojení do půdy nepřekračujte aplikační koncentraci 10 % z důvodu homogenity dávkování.

Sulka Ca je vhodná i pro hnojení sadby česneku, cibule nebo hlíz užitkových rostlin. Doporučuje se jejich namáčení po dobu 6 - 12 hod ve 4 % ním rozoku, nechat vysušit a pak vysadit.

Sulka Ca je hnojivo pro foliární aplikaci zejména jako prevence a na odstranění příznaků nedostatku vápníku na zelenině a ovoci, je určeno pro doplnění vápníku pro vápnomilné kulturní rostliny. Při aplikaci v intervalech 10 - 14 dní. Aplikuje se foliárně 2 - 3 l/ha (1,5 - 2,5 % koncentrace). Koncentrované hnojivo na předcházení a odstranění nedostatku síry s aplikací na list.

Podmínky pro aplikaci:

Optimální teplota během aplikace na dřevo a při foliární aplikaci je 10 - 20 °C. Ideální je bezvětorné počasí s nízkou intenzitou slunečního záření v ranních nebo večerních hodinách.

Foliární aplikace na mladých listech a kvetoucích plodin se nedoporučuje, protože může způsobovat nekrózy - popáleniny.

Sulka Ca není mísitelná s jinými přípravky a ani s jinými listovými hnojivy.

Přednosti Sulky Ca:

Nejkonzentrovanější zdroj síry v čiré roztokové formě.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

kadmium 1; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH0331 uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování:

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu, odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah balení: 200 ml

Parametry

Sazba DPH

21,00