

Sulka Ca 5 I Agrobio hnojivo s účinkem proti kadeřavosti a moření cibulovin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	450207
Hmotnost	5,2000
EAN	8595660505832
Balení	5,6000

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

Sulka Ca 5 I Agrobio hnojivo s účinkem proti kadeřavosti a moření cibulovin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Účinné látky: polysulfid vápenatý Jak účinkuje: používá se jako půdní hnojivo zejména pro půdy chudé na síru, nebo jako aplikace pro rostliny náročné na síru patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě, která je po aplikaci na list dobře přijímána rostlinami, část v rychle působící a část v pozvolně působící formě obsahuje vysokou koncentraci vodorozpuštěného vápníku, který po aplikaci přechází na méně rozpustnou uhličitanovou a síranovou formu, ale i na dobře rozpustnou tiosíranovou formu přítomnost tiosíranu vápníku prodlužuje dostupnost dusíku pro rostliny snižuje kyselost půdy a váže kyslík a oxid uhličitý ze vzduchu pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny Pro jaké rostliny? česnek cibuloviny brambory košťáloviny olejiny broskvoně (před rašením) révu vinnou (před rašením) ovocné stromy (před rašením) pro základní hnojení půdy Jak jej použít? je určena pro základní hnojení půdy, aplikuje se po zředění vodou v závislosti na náročnosti ošetřovaných rostlin je vhodná i pro ošetření sadby česneku, cibule, nebo hlíz užitkových rostlin. Doporučuje se jejich namáčení po dobu 6-12 hod ve 4 %-ním roztoku (60-65 ml/2 l), nechat vysušit a pak vysadit. je hnojivo vhodné pro aplikaci postřikem zejména jako prevence a na odstranění příznaků nedostatku vápníku na zelenině a ovocí a vinné révě. Je určeno pro doplnění vápníku pro vápnomilné kulturní rostliny. Aplikuje se postřikem v koncentraci 1,5 až 2,5 % (125-200 ml hnojiva na 10 l vody) při aplikaci v intervalech 10-14 dní. Maximální doporučená dávka hnojiva je 30-50 ml/100 m². optimální teplota během aplikace je 10-20 °C, ideální je bezvětřné počasí s nízkou intenzitou slunečního záření v ranních nebo večerních hodinách Nás tip: všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce. Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Brambor, Hnojiva - Přihnojení. 50-60 ml / 30 l / 10 m² Zálivka 5,6,7,8 Cibuloviny, Hnojiva - Přihnojení. 100-120 ml / 30 l / 10 m² Zálivka 4,5,6,7 Olejiny, Hnojiva - Přihnojení. 80-130 ml / 30 l / 10 m² Zálivka 5,6,7,8 Česnek, Hnojiva - Hnojení sadby máčením před výsadbou po dobu 6-12 hodin. Aplikací hnojiva je pozorován druhotný efekt - omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. hádátka zhoubná na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou). 50 ml / 1,5 l vody Moření 3,4,9,10 aktuální aplikace Půda, Hnojiva - Aplikujte se v době vegetačního klidu zálivkou, v závislosti na náročnost ošetřených rostlin na přihnojování sírou a draslíkem. 50-150 ml / 30 l / 10 m² Zálivka 2,3 Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------