

Touchdown Quattro 50ml Agrobio

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům



Kód produktu	449393
Hmotnost	0,1500
EAN	8594013420570
Balení	12,0000

Dostupnost na hlavním skladě:
Dostupné množství na prodejních:

14,0 ks

23,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejních

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

14,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNEDE** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNEDE**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNEDE**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahradkářské potřeby

9,0 ks

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNEDE**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNEDE**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Touchdown Quattro 50ml Agrobio

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

Popis

Totální herbicid pro hubení plevelů a nežádoucí vegetace. Účinná látka: glyfosát 360 g/l jak účinkuje? TOUCHDOWN QUATTRO obsahuje účinnou látku glyfosát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. V rostlinách se rychle šíří. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je TOUCHDOWN QUATTRO translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Proto je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku TOUCHDOWN QUATTRO do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvěšší vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje. Pro jaké rostliny je registrován? cesty mezi záhony nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, antukové hřiště, aj.) půda (příprava před výsevem, výsadbou) réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoň) jak je použít? postřikem na vzrůstající plevele (je přijímám zelenými částmi rostlin) přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! aplikujte pozemně postřikem nedostatečné vypláchnutí aplikáčního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Kalkulačka Nezemědělská půda, Nežádoucí dřeviny - Nátěr nebo nástřik 15% roztoku do záseků kminku. 150 ml / 1 l / 100 m² Nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Orná půda, Plevel vytrvalý - Po sklizni. Orná půda, strniště. Ošetřuje se proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům po sklizni. 40 ml / 2 l / 100 m² Postřik 8,9,10 Orná půda, Pýr plazivý - Po sklizni. Orná půda, strniště. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3-4 vyvinutých listů. 30-40 ml / 2 l / 100 m² Postřik 8,9,10 Ovocné dřeviny, Plevel - OL=7. Mimo broskvoň. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Ovocné dřeviny, Plevel jednoletý - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Ovocné dřeviny, Turanka kanadská - OL=7. Mimo broskvoň. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevel - OL=7. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevel jednoletý - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevel - OL=7. Mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 30-60 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Réva vinná, Plevel jednoletý - OL=7. Postřik pod korunami stromů. Nesmí být zasaženy listy ovocných stromů. Vyšší dávku použít proti svláči rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, p ři kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě. 20 ml / 2 l / 100 m² Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - Aplikace na hřištích, chodnicích, parkovištích, hřbitvech, skladovacích plochách, v areálech podniků, apod. 40-50 ml / 1-2 l / 100 m² Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Plevel jednoletý - Cesty mezi záhony, komposty. 20-30 ml / 1-3 l / 100 m² Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Nezemědělská půda, Plevel vytrvalý - Cesty mezi záhony, komposty. 30-50 ml / 1-3 l / 100 m² Postřik, nátěr 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace Půda, Plevel jednoletý - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 20-30 ml / 1-2 l / 100 m² Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevel jednoletý - Příprava před výsadbou. Výsadbu po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 20-30 ml / 1-2 l / 100 m² Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevel vytrvalý - Příprava před výsadbou. Výsadbu po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 30-40 ml / 1-2 l / 100 m² Postřik 3,4,9,10 Půda, Plevel vytrvalý - Příprava před výsevem. Výsev po aplikaci provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů. 30-40 ml / 1-2 l / 100 m² Postřik 3,4,9,10

Parametry

Sazba DPH

21,00