

# Toutatis DamTec 2x24g k likvidaci jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách, hrachu, bobu a mrkvi

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

Kód produktu	451290
Hmotnost	0,1500
EAN	8595660506884
Balení	8,0000

Herbicid k likvidaci jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách, hrachu, bobu a mrkvi.

Dostupnost na hlavním skladě:

Dostupné množství na prodejnách:

Na dotaz

7,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 6**

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

7,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

# Toutatis DamTec 2x24g k likvidaci jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách, hrachu, bobu a mrkvi

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

## Popis

Herbicid k likvidaci jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách, hrachu, bobu a mrkvi Účinná látka: aklonifen (ISO) 500 g/kg (52 % hm.), klomazon (ISO) 30 g/kg (3,1 % hm.) Přípravek je půdní preemergentní herbicid pro likvidaci jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů. Obsahuje dvě účinné látky: Klomazon zabraňuje klíčení plevelů, Aklonifen je přijímán klíčovými rostlinami prorůstajícími přes herbicidní film na povrchu půdy. Aplikace před vzejitím plevelů (preemergentní herbicid = aplikuje na půdu ještě před tím, než plevele vyklíčí a vzejdou nad povrch) **Brambory:** V bramboru aplikujte po poslední proorávce, nejpozději 5 dnů před vzejitím. **Hrách, bob, mrkev:** suché semeno v půdě, před vzejitím **Ochranná lhůta = AT** (ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní) **Spektrum plevelů:** Plevelé citlivé - chundelka metlice, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, peníze rolní, hořčice polní, violka rolní, laskavce, řepka olejka-výdrol, bažanka, pětour maloubořný, mléč, merlík bílý, svízel pětúla, rdesna, starček, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, mák vlčí, lebeda rozkladitá, ptačinec žabinec, rozrazil perský **Dávkování:** 24 g/100 m<sup>2</sup> /2-4 l vody (12 g/50 m<sup>2</sup> / 1-2 l vody) Aplikace postřikem Max. počet aplikací v plodině: 1x Aplikace: Odpovídající množství přípravku vsypte do nádoby určené pro postřik naplněné do poloviny vodou a dostatečně zamíchejte (protřepete) poté doplňte na stanovený objem. Při přípravě aplikační kapaliny používejte osobní ochranné pracovní prostředky a nepoužívejte kontaktní čočky. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci. **Bob, Plevelé - OL=AT.** Aplikace postřikem - suché semeno v půdě, před vzejitím, plevele před vzejitím. Max. počet aplikací v plodině: 1x. plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté. 24 g / 2-4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 3,4 aktuální aplikace **Brambor, Plevelé - OL=AT.** Aplikace postřikem po výsadbě, po poslední proorávce, nejpozději 5 dní před vzejitím, plevele před vzejitím. Max. počet aplikací v plodině: 1x. plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté. 24 g / 2-4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 3,4 aktuální aplikace **Hrách, Plevelé - OL=AT.** Aplikace postřikem - suché semeno v půdě, před vzejitím, plevele před vzejitím. Max. počet aplikací v plodině: 1x. plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté. 24 g / 2-4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 3,4 aktuální aplikace **Mrkev, Plevelé - OL=AT.** Aplikace postřikem - suché semeno v půdě, před vzejitím, plevele před vzejitím. Max. počet aplikací v plodině: 1x. plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté. 24 g / 2-4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik

## Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------